

薬袋番号 (1/6)



ルプラック錠4mg

剤形 錠剤 Y-LU4

用法 朝食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	1	0	0	0

日数 90日分

色形状 白色



【効能効果】

尿を出してむくみをとったり、血圧を下げたりするお薬です。

【注意事項】

服用後、排尿が近くなりますが、お薬の作用のためですので心配いりません

めまい、ふらつき等をおこすことがあるので、高所作業や車の運転には注意して下さい

薬袋番号 (2/6)



リーバクト配合顆粒

剤形 顆粒剤 AJ-601

用法 毎食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	1	1	1	0

日数 90日分

色形状 白色

【効能効果】

不足するアミノ酸を補給して栄養状態を改善する薬です。

【注意事項】

以下の症状に気付いたらなるべく早めに医師または薬剤師に相談して下さい。腹部膨満感、嘔気、下痢、便秘、腹部不快感、腹痛、嘔吐、食欲不振、胸やけ、口渴、おくび。

薬袋番号 (3/6)



ウルソ錠100mg

剤形 錠剤 235

用法 毎食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	2	2	2	0

日数 90日分

色形状 白色



【効能効果】

胆石を溶かしたり、胆汁の流れをよくしたり、肝臓の機能を改善するお薬です。

【注意事項】

以下の症状に気付いたらすぐに医師または薬剤師に相談して下さい。発熱、咳、呼吸困難。

薬袋番号 (4/6)



モニラック・シロップ65%

剤形 液剤

用法 毎食後

日数 90日分

色形状 無色～淡黄色澄明

【効能効果】

血液中のアンモニア量を下げerお薬です。また、腸にたまったガスや便の排出にも用いられます。

<< 次ページに続きがあります >>

薬袋番号 (5/6)



オメプラール錠10

剤形 錠剤 311

用法 朝食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	1	0	0	0

日数 90日分

色形状 白色



【効能効果】

胃酸の分泌を強く抑え、胃を保護するお薬です。

【注意事項】

症状がなくなっても医師の指示通り服用を続けて下さい。

以下の症状に気付いたらすぐに医師または薬剤師に相談して下さい。
全身倦怠感、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる、物が見えにくい、眼がかすむ、視野がせまくなる、尿量減少、むくみ、手足の筋肉の痛み、こわばり、赤褐色尿。

薬袋番号 (6/6)



マグミット錠330mg

剤形 錠剤 KCI 11

用法 毎食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	1	1	1	0

日数 90日分

色形状 白色



【効能効果】

このお薬は一般名酸化マグネシウムというジェネリック医薬品です。
先発医薬品の重質酸化マグネシウムと同じお薬です。

胃酸を中和して、胃・十二指腸潰瘍、胃炎の症状を改善するお薬です。また、便秘の改善や尿路結石の防止にも用いられます。

【注意事項】

このお薬は水なしでも服用できます。

大量の牛乳やカルシウム製剤は、高カルシウム血症などを起こすおそれがありますので、ひかえて下さい。

以下の症状に気付いたらすぐに医師または薬剤師に相談して下さい。
吐き気・嘔吐、口渇、血圧低下。