

患者様番号

診察科名 外科

患者氏名

薬袋番号 (1/5)



リーバクト配合顆粒

剤形 顆粒剤 AJ-601

用法 毎食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	1	1	1	0

日数 90日分

色形状 白色

【効能効果】

不足するアミノ酸を補給して栄養状態を改善する薬です。

【注意事項】

以下の症状に気付いたらなるべく早めに医師または薬剤師に相談して下さい。腹部膨満感、嘔気、下痢、便秘、腹部不快感、腹痛、嘔吐、食欲不振、胸やけ、口渇、おくび。

薬袋番号 (2/5)



ウルソ錠100mg

剤形 錠剤 235

用法 毎食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	2	2	2	0

日数 90日分

色形状 白色

【効能効果】

胆石を溶かしたり、胆汁の流れをよくしたり、肝臓の機能を改善するお薬です。

【注意事項】

以下の症状に気付いたらすぐに医師または薬剤師に相談して下さい。発熱、咳、呼吸困難。

薬袋番号 (3/5)



ラグノスゼリー

剤形 ゼリー Sc245

用法 毎食後

日数 90日分

色形状 淡褐色～褐色

【効能効果】

このお薬は一般名ラクツロースというジェネリック医薬品です。先発医薬品のカロリールゼリーと同じお薬です。

血液中のアンモニア量を下げのお薬です。また、腸にたまったガスや便の排出にも用いられます。

【注意事項】

天然の成分を含有しているため製品によってゼリーの色が濃いことがあります。薬効・安全性に問題はありませぬ。

<< 次ページに続きがあります >>

患者様番号

診察科名

外科

患者氏名

薬袋番号 (4/5)

ネキシウムカプセル10mg



剤形 カプセル AZ 10

用法 朝食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	1	0	0	0

ネキシウム10



日数 90日分

色形状 灰紫色/うすい黄色

【効能効果】

胃酸を抑えるお薬です。胃酸を抑えることで、それによる胃粘膜への刺激が弱くなるので胃潰瘍や十二指腸潰瘍の治癒につながります。また、鎮痛薬（非ステロイド性抗炎症薬）、または、低用量アスピリンによる胃潰瘍の再発を抑えます。その他に、ヘリコバクター・ピロリの除菌療法にも用います。

【注意事項】

以下の症状に気付いたらすぐに医師または薬剤師に相談して下さい。あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、疲れやすい、運動時の息切れ、のどの痛み、頭痛、筋肉痛、食欲不振、吐き気、皮膚や白目が黄色くなる、腹部膨満感、から咳、息苦しい、関節痛、発疹、嘔吐、判断力低下、時間や場所などがわからない。

薬袋番号 (5/5)

マグミット錠330mg



剤形 錠剤 KCl 11

用法 毎食後

起床時	朝食後	昼食後	夕食後	寝る前
0	1	1	1	0

11 KCl



日数 90日分

色形状 白色

【効能効果】

このお薬は一般名酸化マグネシウムというジェネリック医薬品です。先発医薬品の重質酸化マグネシウムと同じお薬です。胃酸を中和して、胃・十二指腸潰瘍、胃炎の症状を改善するお薬です。また、便秘の改善や尿路結石の防止にも用いられます。

【注意事項】

このお薬は水なしでも服用できます。大量の牛乳やカルシウム製剤は、高カルシウム血症などを起こすおそれがありますので、ひかえて下さい。以下の症状に気付いたらすぐに医師または薬剤師に相談して下さい。吐き気・嘔吐、口渇、血圧低下。